

## 医療現場レポート



「インプラント治療では、インプラント歯周炎になりにくい歯をつくることも重要です」と小原澤友伸理事長

**先端機器により安心治療を実現**

のぶ：デンタルクリニックでは、豊富な知識と高い技術力をベースとしたインプラント治療で実績を上げている。2014年1月より12月のインプラント症例数は200本を超える。

高度治療については、ザイゴマ（頸骨）インプラントを用いたオールオン4はもちろん、頸の骨や歯肉が足りないという難症例の場合も、最新技術を用いて対応している。

**コンピューターガイドなどの  
審美性やかみ合わせに配慮した安心なインプラント治療を実践**

「頸の骨の薄い方には骨形成タングク質（BMP）治療を行っています。プロテインを使って頸の骨を吸収させないで骨を再生させる最新治療」と小原澤友伸理事長。「歯肉も3～5mmの厚みがあり、密度が高いものでないとインプラント治療は難しいといいます。そうしたことが十分にわかつた上でなければ、安心な治療はできません」と言葉を続ける。

インプラント治療では、インプラントを埋め込む位置も大切だ。同院では、歯科用CT（コンピューター断層撮影法）やコンピューターガイドシステムなどの先端機器を導入。CTデータをもとに確実な診断を行い、3D画像による的確なインプラント埋入計画を立て、安心治療を実現している。





### インプラント治療では 審美性やかみ合わせも重要

小原澤理事長は、「インプラント治療では、審美性やかみ合わせも重要です」と指摘する。かみ合わせでは、国内に先駆けて最新機器の頸機能咬合解析システムも導入している。下頸の動きを1mm以下の単位でリアルタイムに表示し、その記録に基づいて咬合器の調節を行う。この咬合器は塑機能咬合解析

医療法人社団 歯整会 のぶ：デンタルクリニック  
<http://www.nobudental.com/>

中町本院 東京都世田谷区中町4-17-9  
柏谷ビル1F TEL.03-5760-4618

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝  
10:00～13:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ / /  
14:30～20:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ / /  
14:30～18:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ / /



かみ合わせ・審美歯科サイト  
<http://ago118.com/>

三宿院 東京都世田谷区下馬1-20-13  
コーヒービル1F TEL.03-3487-4618

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝  
10:00～13:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ / /  
14:30～20:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ / /



難症例をはじめとする  
高度インプラント治療を行う

# インプラント

## 教えて！東京ドクター



のぶ：デンタルクリニック 理事長  
**小原澤 友伸** 歯科医師

こはらざわともひろ  
1994年、日本歯科大学卒業。東京医科歯科大学総合診療科を経て、2002年に医療法人社団整会の「アーティカルクリニック開院。04年、のぶ：デンタルクリニック三宿開院。これまでにボルトガル・スペインおよびペニシルバニア大学にインプラント留学

### Q. インプラントって何？

むし歯や歯周病、交通事故などにより歯がなくなったり、先天的に歯がなかったりする場合、歯の抜けた部分の頸の骨（骨槽骨）に人工歯根を埋め込んで頸の骨と接合させ、それを土台に人工の歯を装着する治療法をインプラント治療と呼びます。



インプラントは、①頸の骨に埋め込むインプラント体（フィクスチャー、人工歯根）、②歯肉（歯ぐき）の上に出る人工歯（上部構造）、③この2つをつなぐアバットメントの3つで構成されています。

### Q. 費用はどれくらいかかるの？

インプラントの治療費は、一般的に1本あたり20万～50万円が相場といわれています。中には1本10万円以下のインプラント治療をアピールしている歯科医院もあります。しかし、安さが売り文句の広告・宣伝に飛びついでしまうのは危険といえるでしょう。

インプラント治療は基本的に健康保険がきかないため高額になります。だからこそ、信頼のおける歯科医院で治療を行うことが大切です。

### Q. どんな歯科医師に頼んだらいい？

「どんな症例でもインプラント治療が簡単にできます」という歯科医師は要注意です。インプラント治療では、歯肉も骨もある程度の厚みが必要であり、インプラントを埋め込む位置の重要性についてもしっかり考えているドクターがいいですね。



### Q. 治療の注意点は？

歯の根っここの部分の根尖性歯周炎などの根尖病巣により歯肉が腫れたり、歯肉の量が減っていたり、ばい菌で骨が溶けている場合は、それらの治療を優先的に行う必要があります。

歯肉が足りなければ歯肉を増やし、骨が足りなければ骨を移植するなどの方法を行った上で、インプラント治療に臨みます。